

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN  
TECHNIQUE  
DES  
STATIONS  
D'AVERTISSEMENTS  
AGRICOLES

DLP -1-6-66 510828

PUBLICATION MENSUELLE Imprimerie de la Station Rhône-Alpes  
Directeur-gérant: L. BOUYX

## ÉDITION DE LA STATION RHONE - ALPES

(AIN, ARDECHE, DROME, ISERE, LOIRE, RHONE, SAVOIE, HAUTE-SAVOIE)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux. 4, place Gensoul - LYON.

C. C. P.: LYON 9.430-12

TÉLÉPHONE (78) 37-20-56

Lisez sur l'enveloppe de ce bulletin le numéro de votre région

ABONNEMENT ANNUEL

15 F

1er supplément au bulletin N° 68 de Mai 1966

18 Mai 1966

page 18

### V I G N E

#### AVERTISSEMENTS

BLACK-ROT (zones contaminées) - MILDIU - Le traitement conseillé par le bulletin précédent devra être renouvelé soit dans les premiers jours après une précipitation importante, soit, à défaut de cette précipitation, au plus tard 10 jours après ce traitement précédent en raison de la croissance rapide.

TORDEUSES DE LA GRAPPE - Le premier traitement préventif en toutes régions, pourra encore être appliqué jusqu'au 20 mai, faute de quoi un traitement curatif pourra encore être efficace jusqu'au 27 mai.

### ARBRES FRUITIERS

#### AVERTISSEMENTS

TAVELURE DU POMMIER - Aux altitudes les plus élevées, appliquer un nouveau traitement 12 à 14 jours après le précédent et ne le renouveler dans les mêmes délais (ou plus rapidement en cas de forte pluie) qu'en cas d'apparition de taches entre temps.

TAVELURE DU POIRIER - Dans les vergers où aucune tache ne sera apparue aux dates suivantes - Ardèche au sud du Doux et Drôme au sud de la Drôme: le 27 mai - Autres régions: le 24 mai. Les traitements à 12 jours d'intervalle pourront être suspendus à partir de ces dates et jusqu'à nouvel avis. Dans le cas contraire, continuer à suivre la cadence indiquée dans le bulletin du 10 mai.

BACTERIOSE DU NOYER - Appliquer un traitement cuprique à la chute des châtons.

ANTHRACNOSE DU CERISIER - Le premier traitement ne devra être renouvelé qu'en cas de retour à un temps pluvieux.

CARPOCAPSE SUR POMMES ET POIRES - Le premier traitement devra être appliqué entre le 24 et le 27 mai dans les régions suivantes: AIN: 46 et 119 - ARDECHE: 141, 142, 143, 145, 147 et 152 - DROME: 121, 122, 124, 125, 130, 131, 132, 133 et 134 - ISERE: 101, 103 et 121 - LOIRE: 12 - RHONE: 24 et 26 - SAVOIE et HTE SAVOIE: néant.

MOUCHE DE LA CERISE - Le traitement doit se placer à partir de maintenant, mais dès que les premiers fruits commenceront à virer au rouge (ou au blanc sur les variétés blanches) c'est à dire dès réception dans les régions les plus chaudes.

### INFORMATIONS MARAICHERES ET LEGUMIERES

TEIGNE DU POIREAU - Nous conseillons d'effectuer lors du repiquage un pralinage avec trempage des plants pendant 15 minutes dans une bouillie contenant 25gr/hl d'une poudre mouillable à base de parathion.

DORYPHORE & PUCERONS - Il convient dès maintenant de surveiller l'apparition des larves et de leur appliquer rapidement un traitement à l'aide d'un des produits de la liste. En cas de présence de pucerons, choisir un produit également efficace contre ces derniers.

L'Inspecteur de la Protection  
des Végétaux: A. PITHIQUOT

Le Contrôleur chargé des  
Avertissements Agricoles: P. LATARD

7442